No. 45

Observation sur une hernie ~~[illegible]~~ a la partie posterieure de la region lombaire.

Un homme agé d'environ trente ans fut renversé par un carosse dont les chevaux avoient pris le mord aux dents. La roue lui passa directement sur le ventre de gauche a droite precisément entre la derniere des fausses côtes et la creste des os des illes. Le blessé sentit aussitot de vives douleurs dans tout le bas ventre, on le saigna plusieurs fois du bras. on fit les fomentations convenables pour s'opposer a l'inflammation, mais malgré ces secours le malade mourut le quatrieme jour.

J'eus occasion de faire l'ouverture du cadavre, et je trouvai une grande inflammation dans les visceres du bas ventre, beaucoup de sang infiltré du côté gauche dans la membrane adipeuse qui entoure le rein, et du côté droit une hernie ventrale vers la partie posterieure

ARC 16 d. 2 n° 65

ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE

de la region lombaire. cette hernie etoit formée par une circonvolution d'environ quatre ou cinq pouces de l'intestin ileon. ~~qui n'etoit~~ ~~a travers le peritoine qui etoit rompu~~ ~~recouvert que de la peau et de la graisse~~ ~~precisement dans l'endroit ou cette membrane~~ ~~il y avoit une rupture au peritoine une~~ recouvre ~~rupture a travers de laquelle passoit l'intestin~~ ~~ileon~~ l'angle que font le grand et le petit oblique en se croisant posterieurement ~~de sorte que l'ileon n'etoit recouvert que de la peau et de la graisse~~ ~~il~~ etoit etrangle et fort gonflé de vents. ~~il en resultoit~~ il faut cependant ~~rendre~~ estre encore considerablement enflammé.

Personne n'ignore que les pressions violentes et subites peuvent produire des hernies ventrales, que dans ce cas ~~il y a presque~~ aiant ~~tout court~~ rupture au péritoine, les parties déplacées se trouvent immédiatement sous la graisse ou sous les muscles, et qu'ainsi ces sortes de hernies doivent estre operées avec encore plus de precaution que les autres. ces conséquences n'auroient rien que de trop commun pour fonder l'utilité d'une observation; mais ce qui paroit important dans le

fait vaporté, c'est l'assemblage des circonstances les plus capables d'en imposer, et de faire dans un cas semblable méconnoître la hernie.

La situation seule semble d'abord en eloigner tout soupçon; en effet on croit communement que les hernies ~~[illegible]~~ ne peuvent avoir leur siége qu'aux parties anterieures du bas ventre. La region posterieure fortifiée des os et de muscles epais paroit ne pouvoir permettre la ~~[illegible]~~ sortie des parties flotantes dans la ~~[illegible]~~ cavité ~~ventre~~, si ce n'est lorsque le peritoine et les muscles ont été divisés par quelque plaie ou encor séquence de quelques abscès. D'un autre côté la hernie située comme on l'a dit, se trouve dans un lieu ou un volume considérable de parties peut se loger sans faire une tumeur fort sensible. ~~mais~~ ~~de plus~~ d'ailleurs dans le cas de notre hernie, quand même ~~a lieu de la tumeur fut elle apparante, on pourroit~~ la tumeur eut été apparante on auroit pu la regarder comme ~~etant de même nature que la tumeur ducoté opposé~~ une contusion, la même cause, c'est a dire la roue du

qu'avoit coupus le côté ~~droit~~ gauche ~~ainsi du~~
Carré ~~ayant également les deux côtés~~
~~ce semble produire le même effet du côté opposé~~
~~côté droit~~. Les premiers accidents de la
hernie, la douleur, la tension ~~pourroient aussi~~
~~pourroient être~~ pouvoient donc
être pris pour les simptomes ~~d'une contusion~~
~~ou d'un ancien~~
~~d'une~~ d'une tumeur inflammatoire, ~~d'autant~~
d'autant
plus que dans l'endroit de signé l'épaisseur
des téguments empêche de distinguer au tact
ce qui ~~fait~~ forme la tumeur. il n'y auroit precisé=
=ment que le gargouillement que le malade
sentiroit lui même ou que le chirurgien
appercevroit en touchant, qui put caracteriz
la hernie; mais ce gargouillement ne se
fait ~~point~~ plus sentir lorsque l'étranglement
est considerable, comme il doit naturellement être
~~dans l'une sans dont il s'agit~~
~~après les premiers jours, même quelques heures~~
dans le cas ou les intestins sont sortis avec violence
~~après l'accident en un mot lorsque la~~
en rompant le peritoine.
~~tumeur paroit assez elevée et avec engorgée~~
~~d'accidents assez vifs pour engager le~~
~~chirurgien à quelques recherches~~, à l'égard
des autres simptomes de la hernie etranglée
tels que les ~~douleurs violentes, dans le bas~~ cholliques, les tranchées

ACADEMIE DE MEDECINE

L'elevation, la tension du ventre, ~~ventres, les choliques~~, les nausées, les vomissements, ~~merpa~~ de matieres fecales, ~~elevation, la tension du ventre~~, ~~qui~~ qu'est qui empecheroit de les attribuer a linflammation qui doit ~~etre~~ visiblement ~~etre~~ la suite de pressions et de contusion, aussi violentes que celles que doit faire la voüe d'un carosse en passant sur le ventre.

Si donc comme on l'a avancé, tout dans de pareilles circonstances peut faire ~~eloigne~~ ~~reconnoitre la hernie~~ ~~d'une hernie ventrale~~, ~~il peut~~ il pourra arriver aussi qu'apres avoir dompté par des saignées, des fomentations et autres remedes, ~~l'inflamma:tion~~, les contusions interieures et exterieures, le malade mourra ensuite en consequence d'une hernie etranglée; ou plustost il pourra faire ~~peut arriver~~ que l'etranglement de la hernie entretenant la cause d'inflammation, ~~on ne pourra la dompter par~~ les remedes les plus propres, ~~seront insuffisants pour la dompter~~, et que le malade ~~mourra~~ perira d'une gangrene au bas ventre. mais lorsqu'on est prévenu de la possibilité d'une hernie au lieu de saigné, il n'est pas impossible d'en

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

démesler les signes de façon a lever entièrement
l'équivoque qu'on vient d'exposer.
Supposant donc une hernie avec toutes les circons=
=tances détaillées, on commencera de la soupçonner
des qu'on ~~saura~~ sçaura l'accident qui aura —
précédé, et on cherchera cette hernie du côté
opposé a celui qui aura d'abord été pressé de la
Rouë. ce côté premier pressé sera beaucoup plus contus
que l'autre, et par conséquent la douleur, la —
tention, le gonflement y seront d'abord plus —
considerables que du côté opposé. ces signes
et qui paroit devoir naturellement arriver ~~dans tout cas~~
ce qu'on ~~a remarqué~~ dans le fait dont il s'agit.
~~semblable~~. tandis que les accidents diminueront
du côté le plus contus, soit que la resolution soit
que la suppuration s'y fasse, on voit survenir ~~les mêmes~~
~~symptomes~~ augmenter ces mêmes simptomes du
côté qui d'abord sembloit avoir le moins souffert,
cette circonstance ~~a~~ contribuera beaucoup a
confirmer le soupçon de la hernie de ce côté.
mais quand cette alternative ne se trouveroit
pas si marquée, une hernie dont les accidents
ne font que commencer, se peut encore —
malgré l'epaisseur des tegiments, distinguer d'une

contusion par le tact. lorsqu'il y a eu contusion
les téguments sont intéressés dans le gonflement,
et ils ne le sont pas de même, lorsque les accidents de
la hernie ne sont que commencés. L'équivoque
qui se trouve lorsque les symptomes sont avancés,
et que la tumeur a acquis un certain volume,
ne s'y trouvera donc pas de même lorsque prevenu
comme on doit de la possibilité de la hernie, on examinera
dès les premiers temps la ~~[illegible]~~ région lombaire.
enfin quand même la nature de la tumeur ne
se manifesteroit pas suffisament au toucher, les
douleurs de cholliques et de tranchées, qui dans le
cas de la hernie viendroient se terminer au lieu
où l'intestin seroit etranglé, fourniroient un signe
qui joint aux autres denoteroit la hernie avec
quelque certitude; mais cette espece de certitude ne peut
venir que de la reunion de tous les signes, ~~principaux~~ car il
faut convenir que chacun d'eux pris separément
laisseroit encore ~~sous d'une~~ dans l'équivoque.

Il est inutile ~~de faire sentir~~ d'insister
sur l'avantage qu'il y a de connoître des ~~hernie~~
le commencement ime semblable hernie.
ce n'est pas qu'on puisse alors se flatter de
reussir a en faire la réduction par le

que les plaies d'armes a feu qui pénètrent dans la cavité du bas ventre sont plus rarement suivies de hernies ~~ventrales~~, que les autres plaies pénétrantes dans cette cavité

~~moien de~~ toucher sans operation. en effet
quand même il seroit possible de la reduire
par ce moien, il seroit toujours obligé d'en
venir ~~de faire~~ nécessaire l'opération; pour empêcher que
~~sortissent~~ les parties
ne sortissent de nouveau ~~sans qu'on fut~~ a travers la rupture du peritoine.
La compression du bandage seroit certainement un moien
~~suffisant pour les~~ ~~le moien du bandage~~ ~~en effet~~
~~suffisant pour les~~ ~~la contenir~~ ~~sans ce cas a l'égard de l'intestin~~
~~pour qu'on seroit nécessaire~~
~~être assez exacte pour empêcher l'intestin~~
~~de sortir de nouveau par l'ouverture du peritoine~~
~~Quand même~~ donc que l'operation ne ~~seroit~~ fut pas
necessaire pour reduire les parties, elle la seroit
pour remedier a la rupture du peritoine. mais on
demandera peut-être quelle espece d'operation il
conviendroit mieux de pratiquer. La gastroraphie
inventée pour reunir les plaies du peritoine, semble
en a appropriée, cependant outre qu'elle seroit assez
difficile a pratiquer a l'endroit ou etoit la rupture
elle n'est peut-être pas encore le moien le plus sûr
qu'on puisse employer pour la réunion du peritoine
ceux aqui on a fait la gastroraphie etant
presque tous sujets a des hernies ventrales apres
l'operation, il ne faut d'autre preuve oque la
réunion du peritoine ne se fait pas, ou bien que la
réunion des chairs et des muscles, faite comme on
a coutume de le dire, suivant la premiere intention
~~cette dire sans suppuration, que cette espece de réunion~~ ~~n'est~~
~~n'est pas une réunion suffisante~~ peut être
apres la réunion qu'on nome selon la seconde
intention ou celle qui se fait par suppuration
~~ce ne peut être ce sens que par~~ la cicatrice seroit elle plus propre
a resister. ~~Car sans doute c'est peut-être pour~~ cette raison

Je finirais par cette reflexion, c'est que le cas de la hernie dont je viens de donner l'observation, ne doit point estre aussi rare qu'on pourroit bien se l'imaginer. il semble même qu'on soit fondé à penser sur la structure des parties, que si l'on en excepte les aines et l'ombilic, il n'est aucun endroit du ventre ou le peritoine opposé moins de resistance, que dans l'angle formé par les bords posterieurs des grands et petits obliques. en effet cette membrane n'est en cet endroit vraiment soutenuë que par la seule aponevrose du transverse comme on le sait qui est tres mince.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE